

Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*)

Identification : Animal boudiné, à corps luisant de couleur noire avec des taches jaunes généralement allongées formant deux bandes parallèles sur le dos. Taille adulte : jusqu'à 210 mm. Peu de risques de confusion avec les tritons, dont le dos, noir dans certains cas, ne présente jamais de taches jaune vif.

Les larves aquatiques de salamandre sont de couleur gris-brun et ressemblent à celles des tritons. Elles s'en distinguent toutefois par la présence de taches claires à la base du dessus des pattes postérieures (et souvent aussi antérieures) et la tête très élargie par rapport au corps.

Où l'observer ? Espèce des forêts feuillues ou mixtes en terrain vallonné, où elle se reproduit dans les sources et petits ruisselets, dans des eaux fraîches et bien oxygénées. Les mares et étangs forestiers sont plus rarement utilisés, au contraire des tritons. En dehors de la période de reproduction (de février à mai, suivant les régions), la salamandre est un animal terrestre.

Quand l'observer ? Espèce essentiellement nocturne, active surtout par temps humide et pluvieux, visible toute l'année lorsque la température dépasse 5°C. Parfois observée le jour, surtout après un orage.

Infos complémentaires (pour la distinction de la salamandre et des quatre espèces wallonnes de tritons) :

http://www.batraciens.be/fileadmin/Rainne/Brochures/NosAmphibiens2011_final.pdf

<http://www.batraciens.be/index.php?id=192>



Salamandre tachetée adulte

Photo : Ruddy Cors



Salamandre tachetée adulte

Photo : Sandrine Liégeois



Larve de salamandre

Photo : Ruddy Cors